

Наружное лечение рецидивирующего генитального герпеса препаратом

«Гепон»

И.М. Шаков, РМАПО, г. Москва

Лечение рецидивирующей герпетической инфекции является чрезвычайно трудной задачей. Существуют различные схемы лечения данного заболевания. Противогерпетические препараты используются как в отдельности, так и в различных комбинациях. В нашем исследовании применялся препарат Гепон в виде монотерапии. Препарат Гепон относится к группе иммуномодуляторов, показан для повышения эффективности иммунной защиты от инфекций, лечения и профилактики оппортунистических инфекций, вызванных бактериями, вирусами или грибами. Активным компонентом препарата является синтетический тетрадекапептид формулы: *Thr-Glu-Lys-Lys-Arg-Arg-Glu-Thr-Val-Glu-Arg-Glu-Lys-Glu*. В данной работе использован препарат Гепон - лиофилизированный порошок по 0,002 г. во флаконах производства ООО «Иммафарма» (Россия).

Таблица 1. Характеристика больных РГГ получавших лечение Гепоном в виде монотерапии до лечения.

Характеристика	Количество больных
<i>Длительность рецидивов (в днях)</i>	
8	8
8	9
9	7
<i>Длительность межрецидивного периода (в неделях)</i>	
6	9
8	14
10	1

Таблица 2. Характеристика больных РГГ, получавших лечение Гепоном в виде монотерапии после лечения

Характеристика	Количество больных
<i>Длительность рецидивов (в днях)</i>	
4	10
5	14
<i>Длительность межрецидивного периода (в неделях)</i>	
6	9
8	14
10	1

Под нашим наблюдением находилось 24 больных рецидивирующим генитальным герпесом, со средним показателем ремиссии 1,5-2 месяца, частотой рецидивов 6 и более раз в год. Длительность рецидивов составляла 8-10 дней. Все пациенты прошли обследование, включавшее осмотр, идентификацию вируса простого герпеса 1-го и 2-го типа методом полимеразно-цепной реакции (ПЦР) из отделяемого урогенитального тракта и очагов на месте высыпаний. До поступления на лечение у наблюдаемых больных были исключены другие ИППП: сифилис, гонорея, трихомониаз, хламидиоз, микоплазмоз, урогенитальный кандидоз. В данной группе больных было 14 мужчин и 10 женщин в возрасте от 23 до 62 лет.

Для местного лечения герпеса применялся крем Гепона, содержащий 0,002г Гепона в 6 г кремовой основы. Перед употреблением в крем добавить 2 мл раствора Гепона (0,002 г Гепона растворить в 2 мл воды для инъекций и тщательно перемешать с кремом Унны). Крем наносился тонким слоем на герпетические поражения кожи 2-3 раза в день.

Критериями эффективности служили показатели длительности и частоты рецидивов.

После проведения лечения длительность рецидивов значительно сократилась и составила у 10 больных 4 дня, у 14 больных 5 дней. При этом отмечалось в течение первого дня лечения выраженное снижение манифестных воспалительных проявлений. Частота рецидивов практически не изменилась. Но вместе с тем последующие рецидивы были менее выраженными.

Таким образом, можно считать, что Гепон является эффективным средством при лечении рецидивирующего генитального герпеса, позволяет значительно ускорить эпителизацию и заживление герпетических поражений, уменьшает клинические проявления при последующих рецидивах.